

**INTENSIVE CARE****0,12% CLOREXIDINA + 0,05% CPC****COMBATTE IL  
BIOFILM ORALE****IT.****COMPOSIZIONE**

Clorexidina Digluconato 0,12%

Cetilpiridinio Cloruro 0,05%

**INDICAZIONI**

- Prima e dopo le cure odontoiatriche
- In persone con eccessiva formazione di placca dentale (biofilm orale)

**MODO D'USO**

- Effettuare uno sciacquo di circa 30 secondi con 15 ml di prodotto non diluito. Ripetere l'applicazione due volte al giorno, mattina e sera dopo igiene orale meccanica. **NON INGERIRE.**
- Si raccomanda di non effettuare un risciacquo con acqua dopo l'uso di Perio-Aid Intensive Care Collutorio.
- La maggior parte dei dentifrici contiene composti anionici che riducono l'efficacia della clorexidina. Pertanto dopo l'uso di questi prodotti e prima di usare Perio-Aid Intensive Care Collutorio, sciacquare la bocca 3 volte con abbondante acqua. Perio-Aid Intensive Care Gel non contiene questi agenti anionici e, di conseguenza, è totalmente compatibile con l'uso di Perio-Aid Intensive Care Collutorio.

**EFFETTI COLLATERALI**

- In certi casi può apparire una alterazione del gusto e in molto rare occasioni irritazione nella lingua, entrambi gli effetti diminuiscono con l'uso continuo del prodotto.
- Questo prodotto contiene Clorexidina che, temporaneamente, può pigmentare denti e lingua. Tale evento può presentarsi occasionalmente solo dopo un uso prolungato e in presenza di alcuni alimenti e bevande cromogene, quali ad esempio vino rosso, caffè, tè e nel caso di fumatori.
- Queste pigmentazioni non sono permanente e si possono evitare con una buona igiene orale, con lo spazzolamento e l'uso di prodotti per l'igiene interprossimale prima di usare il collutorio. Le pigmentazioni possono sempre essere eliminate dal professionista del cavo orale.
- Sono stati riferiti casi, seppure molto rari, di infiammazione delle ghiandole parotidiche, che scompaiono con la sospensione del trattamento.

**PRESENTAZIONE****PERIO-AID Intensive Care****0,12% Clorexidina + 0,05% CPC**

- Collutorio 150 ml
- Collutorio 500 ml
- Spray 50 ml

**PERIO-AID Intensive Care****0,12% Clorexidina**

- Gel per uso topico o spazzolamento dei denti 75 ml

**PERIO-AID Active Control****0,05% Clorexidina + 0,05% CPC**

- Collutorio 150 ml
- Collutorio 500 ml

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta. Non utilizzare in caso di sensibilità ad alcuno degli ingredienti.

# PERIO·AID

MONDSPOELMIDDEL  
ZONDER ALCOHOL

# PERIO·AID

BAIN DE BOUCHE  
SANS ALCOOL

## INTENSIVE CARE

0,12% CHLOORHEXIDINE + 0,05% CPC

BESTRIJDT DE  
ORALE BIOFILM

### NL.

#### SAMENSTELLING

Chloorhexidine Digluconaat 0,12%  
Cetylpyridinium Chloride 0,05%

#### INDICATIES

- Voor en na tandheelkundige behandelingen
- Bij overmatige tandplaquevorming (orale biofilm)

#### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Twee keer per dag spoelen met 15 ml gedurende 30 seconden, 's ochtends en 's avonds na het tandenpoetsen. NIET DOORSLIKKEN.
- Niet met water naspoeien en niet eten of drinken tot een half uur na het gebruik van Perio-Aid Intensive Care mondspoelmiddel.
- De meeste tandpasta's bevatten anionische bestanddelen die de effectiviteit van chloorhexidine verminderen. Na het gebruik van deze tandpasta's, maar voor het gebruik van Perio-Aid Intensive Care Mondspoelmiddel, is het raadzaam om de mond 3 keer met veel water te spoelen. Perio-Aid Intensive Care Gel bevat geen anionische bestanddelen waardoor het zeer goed te gebruiken is in combinatie met Perio-Aid Intensive Care Mondspoelmiddel.

#### BIJWERKINGEN

- Een verandering van smaakperceptie kan in sommige gevallen optreden, irritatie van de tong komt zeer incidenteel voor. Beide effecten verminderen wanneer het gebruik van het product gecontinueerd wordt.
- Dit product bevat de stof Chloorhexidine, een bestanddeel dat de tanden, kiezen en tong tijdelijk kan verkleuren. Deze verkleuringen treden in de regel op na langdurig gebruik en wanneer tijdens de periode van gebruik tevens bepaalde dranken en voedingswaren worden gebruikt zoals rode wijn, koffie, thee en tabak.
- Deze verkleuringen zijn niet permanent en kunnen voor een groot deel worden voorkomen door een goede mondhygiëne. Poets de tanden zorgvuldig en reinig ook tussen de tanden met interdentale hulpmiddelen (ragers) voorafgaand aan het spoelen met het mondspoelmiddel. Mocht dat niet effectief genoeg zijn dan kan een tandarts of mondhygiënist de aanslag verwijderen.
- In incidentele gevallen is er een zwelling geconstateerd van de speekselklieren onder het oor. In alle gevallen is deze zwelling verdwenen zodra de behandeling werd gestaakt.

#### PRODUCTEN

##### PERIO-AID Intensive Care

**0,12% Chloorhexidine + 0,05% CPC**

- Mondspoelmiddel 500 ml
- Mondspray 50 ml

##### PERIO-AID Intensive Care

**0,12% Chloorhexidine**

- Gel om mee te poetsen of lokaal aan te brengen 75 ml

##### PERIO-AID Active Control

**0,05% Chloorhexidine + 0,05% CPC**

- Mondspoelmiddel 500 ml



Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met direct zonlicht vermijden. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

## INTENSIVE CARE

0,12% CHLORHEXIDINE + 0,05% CPC

LUTTE CONTRE  
LE BIOFILM ORAL

### FR.

#### COMPOSITION

Digluconate de Chlorhexidine 0,12%  
Chlorure de Cetylpyridinium 0,05%

#### INDICATIONS

- Avant et après les soins dentaires
- En cas d'accumulation excessive de plaque dentaire (biofilm oral)

#### MODE D'EMPLOI

- 1 rinçage (15ml) pendant 30 secondes, 2 fois par jour: le matin et le soir après le brossage. NE PAS AVALER.
- Après usage, ne pas rincer la bouche à l'eau et ne rien manger ni boire pendant une demi-heure.
- La plupart des dentifrices contiennent des composants anioniques qui réduisent l'efficacité de la chlorhexidine. Après avoir utilisé un dentifrice de ce type, mais avant d'utiliser Perio-Aid Intensive Care Bain de bouche, il est recommandé de se rincer la bouche 3 fois avec beaucoup d'eau. Le Gel Perio-Aid Intensive Care ne contient aucun composant anionique, c'est pourquoi il est idéal de l'utiliser en combinaison avec Perio-Aid Intensive Care.

#### EFFETS SECONDAIRES

- Un changement de perception du goût peut se produire dans certains cas, et une irritation de la langue dans de très rares occasions. Les deux effets diminuent avec l'utilisation continue du produit.
- Ce produit contient de la chlorhexidine, qui peut entraîner une coloration réversible des dents. Du fait de la faible concentration en chlorhexidine, cette coloration se produit très rarement et seulement après une utilisation prolongée, associée à la prise de boissons comme le vin rouge, le café ou à la consommation de tabac.
- Ces colorations ne sont pas permanentes et peuvent être évitées en grande partie en adoptant une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossez vos dents avec soin et nettoyez également vos espaces interdentaires à l'aide d'un outil adapté (brossettes) avant de rincer avec le bain de bouche. Si cette méthode n'est pas assez efficace, un dentiste pourra éliminer les taches.
- Dans de rares cas un gonflement des glandes salivaires sous l'oreille a été constaté. Dans tous les cas le gonflement a disparu dès l'arrêt du traitement.

#### GAMME

##### PERIO-AID Intensive Care

**0,12% Chlorhexidine + 0,05% CPC**

- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml
- Spray 50 ml

##### PERIO-AID Intensive Care

**0,12% Chlorhexidine**

- Gel dentifrice pour le brossage et à usage topique 75 ml

##### PERIO-AID Active Control

**0,05% Chlorhexidine + 0,05% CPC**

- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml

Garder hors de portée des enfants. Prévenir des expositions solaire directe. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants

